

Anagrelid (阿那格雷) 相关用法用量、不良反应及禁忌

【Anagrelid (阿那格雷) 用法用量】

1.成人:盐酸阿那格雷: 初始剂量1mg/天, 分2次给药, 1周, 然后每周加量不超过0.5mg/天, 直到血小板计数在正常水平。常规维持剂量: 1-3mg/天。最大剂量: 10mg/天和2.5mg/剂。

2.儿童:初始剂量: 0.5mg/天。维持剂量: 同成人。最大剂量: 10mg/天和2.5mg/剂。

3.肝损害:中重度肝损害: 避免使用。

【Anagrelid (阿那格雷) 不良反应】

1.心血管系统: 乏力、心悸、水肿, 个别可发生心律失常。

2.消化系统: 腹痛、恶心、腹胀, 发生率为10%左右。肝脏转氨酶升高。

3.呼吸系统: 气短、肺纤维化和肺浸润。

4.神经系统: 头疼 (发生率在亚洲可达一半), 眩晕、无力, 视物模糊或视力有严重影响。

【Anagrelid (阿那格雷) 禁忌】

1.对Anagrelid (阿那格雷) 过敏者禁用。

2.妊娠或有预期妊娠妇女禁用。

3.有严重心血管及肝肾疾病者慎用。