

XADAGO (沙芬酰胺) 用药指南

[人气:131 | 日期: 2022-04-22 | 返回 | 打印]

【研发公司】Zambon SpA及Newron制药

【英文名】XADAGO

【通用名】safinamide

【中文名】沙芬酰胺

【规格】50mg：30粒/瓶、90粒/瓶；100mg：30粒/瓶、90粒/瓶。

什么是XADAGO (沙芬酰胺)？

XADAGO是一种被称为单胺氧化酶B型(MAO-B)抑制剂的处方药，与左旋多巴和卡比多巴一起用于治疗患有帕金森病(PD)的成年人。

尚不清楚XADAGO对儿童是否安全有效。



如果您有以下情况，请勿服用XADAGO：

1.吃另一种叫做a的药单胺氧化酶抑制剂（单胺氧化酶抑制剂)因为它可能会导致你的血压突然严重升高(高血压危象)。

1) 停止服用XADAGO后14天内不要服用MAOI。

2) 如果您在过去14天内停止服用MAOI，请勿开始服用XADAGO。

2.拿一个类鸦片药物，圣约翰草，血清素-去甲肾上腺素再吸收抑制剂(SNRIs)，三环抗抑郁药，四环的抗抑郁药、三唑并吡啶类抗抑郁药、环苯扎林、哌甲酯(或类似药物)，或安非他明(或类似药物)因为它可能会危及生命。如果您不确定是否正在服用这些药物，请咨询您的医务人员。

1) 停止服用这些药物后14天内请勿服用XADAGO。

2) 如果您在过去14天内停止服用这些药物，请勿开始服用XADAGO。

- 3.吃一种用来治疗咳嗽或感冒的药，叫做右美沙芬因为这可能会导致精神病或者异常行为。
- 4.对沙非酰胺有过敏史。对safinamide过敏反应的迹象可能包括舌头、口腔肿胀或呼吸困难。如果您不确定过去是否对safinamide过敏，请咨询您的医务人员。
- 5.有严重的肝脏问题。

服用XADAGO前，请告知您的医务人员您的所有身体状况，包括您是否：

- 1.血压高或低
- 2.患有睡眠障碍，白天出现意外或不可预测的嗜睡，或服用药物帮助睡眠
- 3.喝酒精饮料。这可能会增加你服用XADAGO时昏昏欲睡的几率
- 4.有异常运动史(运动障碍)
- 5.有或曾经有心理健康问题，例如精神分裂症、双相型障碍或者精神，有或曾经有过不寻常的冲动
- 6.你的眼睛有或曾经有视网膜问题，或有视网膜问题的家族史
- 7.已经怀孕或计划怀孕。尚不清楚XADAGO是否会伤害您未出生的婴儿。
- 8.正在哺乳或计划哺乳。尚不清楚XADAGO是否会进入母乳，或者是否会对母乳喂养的婴儿产生副作用。如果您服用XADAGO，请向您的医务人员咨询喂养宝宝的最佳方式。

我应该如何服用XADAGO？

- 1.请完全按照您的医务人员的建议服用XADAGO。
- 2.每天同一时间服用XADAGO。
- 3.吃或不吃XADAGO。
- 4.如果您错过了一剂，请在第二天的同一时间服用下一剂XADAGO。
- 5.您的医务人员可能需要更改XADAGO的剂量，直到剂量适合您为止。
- 6.在未与您的医务人员沟通之前，请勿开始或停止服用XADAGO。
- 7.如果你服用了过多的XADAGO，请拨打1-800-222-1222联系中毒控制中心或立即前往最近的医院急诊室。

服用XADAGO期间应该避免什么？

- 1.避免某些富含酪胺的食物和饮料，如陈酿、发酵、腌制、烟熏和腌制的食物。
- 2.在了解XADAGO对您的影响之前，请勿驾驶、操作重型机械、在高空工作或从事其他危险活动。

我应该如何储存XADAGO？

将XADAGO储存在室温下，约68°F至77°F(20°C至25°C)。
将XADAGO和所有药物放在儿童接触不到的地方。