

Xadago（沙芬酰胺）如何给药？

[人气:159 | 日期: 2022-04-19 | 返回 | 打印]

Xadago（沙芬酰胺）适应症和用法

Xadago被指示作为左旋多巴/卡比多巴的辅助治疗，用于帕金森病 (PD) 患者经历“关闭”发作。

使用限制：Xadago 尚未被证明可作为单一疗法有效治疗 PD。



Xadago（沙芬酰胺）剂量和管理

一、剂量信息

推荐起始剂量为50mg，每天口服一次（在一天中的同一时间），不考虑进餐。两周后，根据个人需要和耐受性，剂量可以增加至每天一次100毫克。

Xadago的每日剂量超过100毫克尚未显示提供额外的益处，更高的剂量会增加不良反应的风险。

Xadago已被证明仅与左旋多巴/卡比多巴联合使用有效。

如果错过一剂，则应在第二天的同一时间服用下一剂。Xadago 100mg应在停止前通过将剂量减至50mg 一周逐渐减量。

二、肝功能不全患者的给药

在中度肝功能不全的患者中（Child-Pugh B: 7-9），Xadago 的最大推荐剂量为50 mg，每天口服一次。

Xadago禁用于有严重肝受损患者（Child-Pugh C: 10-15）。

如果服用50mg Xadago的患者从中度肝损害进展为重度肝功能损害，请停止

Xadago。

Xadago (沙芬酰胺) 禁忌症

Xadago禁用于以下患者：

- 1.同时使用单胺氧化酶抑制剂 (MAOI) 类的其他药物或其他单胺氧化酶强效抑制剂药物，包括利奈唑胺。该组合可能导致血压升高，包括高血压危象。
- 2.同时使用阿片类药物（例如哌替啶及其衍生物、美沙酮、丙氧芬或曲马多）；5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI)、三环、四环或三唑并吡啶类抗抑郁药；环苯扎林；哌醋甲酯、苯丙胺及其衍生物；或圣约翰草。同时使用可能导致危及生命的血清素综合征。
- 3.同时使用右美沙芬。据报道 MAO 抑制剂和右美沙芬的组合引起精神病发作或异常行为。
- 4.对safinamide过敏史。反应包括舌头和口腔黏膜肿胀，以及呼吸困难。
- 5.严重肝功能不全 (Child-Pugh C: 10-15) 。