

# 艾曲波帕Revolade有什么副作用？

日期：2020-08-26人气：180次 [返回](#) [打印](#)

## 信息摘要：

Revolade（艾曲波帕，Eltrombopag）是一种用于治疗许多疾病的药物。包括：低血小板计数（ITP）、丙型肝炎病毒（HCV）、严重再生障碍性贫血（SAA）。REVOLADE可能会引起严重的副作用，包括：...

**Revolade（艾曲波帕，Eltrombopag）是一种用于治疗许多疾病的药物。包括：低血小板计数（ITP）、丙型肝炎病毒（HCV）、严重再生障碍性贫血（SAA）。**



REVOLADE可能会引起严重的副作用，包括：

像所有药物一样，REVOLADE会引起副作用。

严重的副作用（所有适应症）

- 血栓（血栓栓塞事件）
- 由于这种治疗的副作用导致肝功能丧失（药物引起的肝损伤）
- 肝脏功能丧失
- 肾脏内最小血管发生损伤，导致肾功能丧失（血栓性微血管病伴急性肾功能衰竭）。

## ● 成人ITP患者

以下副作用与成人ITP患者的REVOLADE治疗有关。

- 腹泻
- 恶心
- 血液检查中可能出现的非常常见的副作用：增加肝酶（称为ALT）。
- 口干
- 呕吐
- 不寻常的脱发或变薄
- 皮疹
- 背痛
- 疼痛会影响肌肉和肌腱以及骨骼，包括胸部
- 吞咽时喉咙痛或不适
- 尿路感染
- 白内障

- 患有ITP的儿科患者（1至17岁）

据报道，以下额外的副作用与使用ITP的儿科患者（1至17岁）的REVOLADE治疗有关。

- 喉咙痛，流鼻涕，鼻塞和打喷嚏
- 鼻腔，鼻窦，喉咙和上呼吸道感染，感冒（上呼吸道）
- 咳嗽
- 腹痛
- 发热。
- 牙疼
- 鼻子和喉咙疼痛
- 发痒，流鼻涕或鼻塞。

- HCV患者

据报道，以下副作用与在HCV患者中使用REVOLADE联合聚乙二醇化干扰素和利巴韦林治疗有关。

- 发热

- 感觉很累（疲劳）

- 发冷

- 头痛

- 恶心

- 腹泻

- 不寻常的脱发或头发稀疏

- 肌肉疼痛

- 瘙痒

- 感到疲倦，虚弱

- 难以入睡

- 食欲不振

- 流感样症状

- 全身肿胀。

- 血液检查中可能出现的非常常见的副作用：减少红细胞数量（贫血）

- 胆红素增加（肝脏产生的物质）。

- 肝功能衰竭（肝功能严重受损）

- 肝脏功能丧失

- 血块

- 皮疹

■白内障。

- 患有严重的非典型性贫血的患者（其他药物效果不佳）

据报道，在严重再生障碍性贫血（SAA）患者中，以下副作用与REVOLADE治疗有关。

■咳嗽

■头痛

■呼吸急促

■口腔和喉咙疼痛

■流鼻涕

■腹泻

■恶心

■瘀血

■关节疼痛

■肌肉痉挛

■手臂，腿，手和脚疼痛（四肢疼痛）

■头晕

■感觉很累（疲劳）

■腹痛

■发热

■血液中中性粒细胞数量极少的发烧（抗感染所需的白细胞）（发热性中性粒细胞减少症）。

■血液检查中可能出现的非常常见的副作用：

增加一些肝酶。

- 皮疹
- 流鼻涕
- 肌肉痉挛
- 白内障。

●患有严重的非典型性贫血的患者（给予标准免疫抑制治疗）

据报道，当SAA患者接受标准免疫抑制治疗时，以下副作用与REVOLADE治疗有关。

- 更强烈的皮肤颜色（色素沉着过度）
- 皮肤或白色眼睛发黄（由于黄疸或血液中色素胆红素水平升高）

如果您遇到上面列出的任何副作用，或者您发现其他任何副作用，请告诉您的医生或药剂师。